



from grass to beef  
ANGUS - Business systems

## Recomandare pentru managementul cirezii ANGUS

### Efectivele de animale/Managementul cirezii

Supravegherea	Se face zilnic la tot efectivul de animale
Nr. Vaci/taur	cca. 30 vaci la un taur (Regula lui Faust)
Ciclul sexual	21 zile, căldurile au durată de cca. ½ până la 1 zi
Perioada de fătare	La cirezile mai mari fătările trebuie grupate într-o anumită perioadă de timp (2 luni). Ideal este, fătarea să aibă loc primăvara sau toamna
Fătarea	Este necesar controlul în timpul fătării; în cazul în care apare o problemă să se poată interveni. Control după fătare: vițelul trebuie să sugă din primul lapte cel târziu după primele 2 ore de la fătare. Colostru, primul lapte după fătare conține elemente vitale care sunt importante pentru sistemul imunitar al vițelului
După fătare	Important e ca din prima zi de viață să se aplice crotalul vițelilor iar masculii trebuie castrați (Karpaten Meat preia doar tăurașii castrați). Informațiile despre tehnica de castrare se pot afla de la echipa Karpaten Meat
Fătări într-un an	Scopul este un vițel pe an
Lactația	În sistemul de creștere de vaci alăptante, vaca nu se mulge, laptele este doar pentru vițel
Montă după fătare	Cel mai devreme după 6 săptămâni de la fătare taurii se pot reintroduce în cireadă
Înțarcarea vițelilor	Tineretul este înțarcat de la vaca mamă începând de la vârsta de 7 - 10 luni
Repaus mamar	Această perioadă trebuie să dureze minimum 1 - 1,5 luni
Managementul fermei	La un efectiv mai mare de animale este recomandat un program de management al fermei informatizat. Cu ajutorul acestui software se pot obține datele necesare conducerii activităților de producție în fermă

### Pășunea

Pregătirea pășunatului	Se recomandă parcelarea pășunii
Gard electric	Vă rog studiați broșura cu tehnicile necesare dotării fermei de bovine ANGUS
Protecție împotriva soarelui și a vântului	Pe pășune e important să existe arbori
Sistem de prindere-garduri tip Coral	Vă rog studiați broșura cu tehnicile necesare dotării fermei de bovine ANGUS

### În adăpost

Necesarul de paie	2 - 8 kg pe vacă alăptantă, în funcție de sistemul de întreținere (în perioada de iarnă)
Suprafața necesară recomandată	6 m <sup>2</sup> pe unitate de vacă care alăptează

În perioada de iarnă

Sistemul de grajd deschis, este indicat adăpostul cu așternut permanent și cu o microclimă apropiată celei exterioare, acest lucru este benefic pentru sănătatea animalelor. Este important ca în perioada de iarnă animalele să poată avea un loc uscat atunci când este ud/frig afară. Recomandat este și padocul ca animalele să poată ieși afară când vor ele. Vă rog studiați imaginile de mai jos.  
Frigul nu dăunează deloc animalelor, dar trebuie adăpostite animalele de curenții de aer și de umiditatea ridicată a aerului

Boxă de fătare, cu așternut de paie și întreținere liberă


Este recomandat ca în grajd să existe 1 - 2 boxe mici unde pentru diferite probleme se pot separa bovinele de restul animalelor.

## Exemple de infrastructură și grajduri

### 1. Grajd cu furajare și stabulație liberă



### 2. Grajd cu adăpost și furajare exterioară



### 3. Grajd cu frontul deschis

